



میراثان خصوصی و فوق تخصصی پارسا

راهنمای رادیوگرافی

هیستروسالپینگوگرافی (HSG)

کد سند: PH-TR-EG-01/00

تاریخ آخرین بازنگری: 1403/04/14

تاییدکننده: مسئول فنی تصویر برداری

وزن

تاریخ مراجعه

نام بیمار

وسایل و داروهای مورد نیاز

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| ۱ عدد | ۱. ویال ویزی پک ۵ سی سی |
| ۱ عدد | ۲. کپسول داکسی سایکلین ۱۰۰ میلی گرم |
| ۱۰ عدد | ۳. قرص استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم |
| ۱ عدد | ۴. سرنگ ۲۰ سی سی فشاری |
| ۱ ورق | ۵. قرص هیوسین |
| ۱ عدد (هرکدام) | ۶. کان بیچار و شلوار پرفوره |
| ۲ عدد | ۷. دستکش جراحی استریل شماره ۷ |
| ۱ عدد | ۸. اسپکولوم واژینال یکبار مصرف متوسط |
| ۱ عدد | ۹. درونشیت بزرگ |
| ۱ عدد | ۱۰. گاز استریل |
| ۱ عدد (هرکدام) | ۱۱. شان ساده و پرفوره استریل |
| ۱ عدد | ۱۲. اسپری لیدوکائین ۱٪ در صد |
| ۲ عدد | ۱۳. شیاف دیکلوفناک ۱۰۰ |

آمادگی ها و نکات مهم

- در صورت سابقه حساسیت (آلرژی) دارویی یا غذایی، آسم، تشنج، بیماری قلبی یا فشارخون، دیابت، نارسایی کلیه، بیماری تیروئید، احتمال بارداری و... ما را در جریان بگذارید.
- در صورتیکه از داروهای متفورمین، اینترلوکین، NSAID، آمینوگلیکوزید، بتابلوکر، داروی فشار، دیورتیک مصرف می نمایید به ما اطلاع دهید.
- از ۴۸ ساعت قبل تا زمان انجام این رادیوگرافی intercourse (رابطه جنسی) نداشته باشید.
- اگر اخیراً D&C (کورتاژ) شده اید و یا دچار عفونت رحمی هستید به ما اطلاع دهید.
- اگر مشکوک به حاملگی یا تاخیر پرپود هستید به ما اعلام کنید.
- از ۲ روز قبل از انجام رادیوگرافی هر ۱۲ ساعت یک عدد کپسول داکسی سایکلین ۱۰۰ بعد از غذا با آب فراوان بخورید.
- روز رادیوگرافی صبحانه کامل بخورید و قبل از انجام رادیوگرافی حتماً مثانه خود را تخلیه نمایید.

توصیه های مهم هنگام مراجعه

- به همراه داشتن تمامی مدارک پزشکی قبلی اعم از رادیوگرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، آزمایش های بالینی و... الزامیست.
- راس ساعت تعیین شده مراجعه نمایید و از تاخیر خودداری فرمایید.
- این رادیوگرافی ممکن است چند ساعت بطول بیانجامد.
- آوردن یک نفر همراه ضروری است.
- قبل از ورود به اتاق رادیوگرافی مثانه خود را کاملاً خالی کنید.
- یک عدد پد بهداشتی همراه داشته باشید.

نکات مهم بعد از رادیوگرافی

- تا دو روز بعد از انجام رادیوگرافی هر ۶ ساعت یک عدد قرص استامینوفن ۵۰۰ مصرف نمایید.
- تا دو روز بعد از انجام رادیوگرافی هر ۱۲ ساعت ۱ عدد کپسول داکسی سایکلین ۱۰۰ مصرف نمایید.
- تا دو روز بعد از انجام رادیوگرافی خونریزی و لکه بینی طبیعی است.



parsa_grand_hospital



www.parsa-hospital.com



۰۲۱ - ۵۳۲۸۳۰۰۰